

# Udredning af urinvejsinfektion hos voksne ikke-gravide

Urinvejsinfektion (UVI) defineres som urinvejs symptomer forårsaget af urinvejspatogene bakterier

**OBS: Urinstix har ingen plads i diagnostik af urinvejsinfektion**

**Urin til dyrkning og resistensbestemmelse (D+R) sendes efter lægelig ordination ved mindst én af flg.:**

- Symptomer på UVI og klinisk mistanke om UVI
- Alvorligt inficeret patient, hvor der også foretages bloddyrkning
- Mistanke om alvorlig infektion og uklart fokus

## Har patienten nytilkomne urinvejssymptomer?

### Typiske symptomer:

- Hyppig vandladning eller nykturi
- Stærk vandladningstrang
- Smerter, svie eller brænden ved vandladning

### Andre symptomer:

- Smerter over blæren eller symfyse
- Lænde- eller flanksmerter
- Nyopstået inkontinens eller blæretømningsbesvær
- Lindring af symptomer efter vandladning
- Synligt blod i urinen

### Symptomer ved kateter:

- Svære ryg- eller flanksmerter
- Feber eller kulderystelser
- Akut delir

**JA**

**NEJ**

**JA**

**NEJ**

### Prøvetagning

Urin til dyrkning og resistensbestemmelse skal være

- Midtstråleurin,
- Urin fra engangskateterisation eller
- Urin fra nyanlagt kateter

Prøven tages før eventuel opstart af antibiotika

### Prøvetagning ved KAD

Før urin tages fra til D+R, anbefales kateter skiftet eller seponeret, hvis det har ligget >48 timer.

**Urinvejsinfektion er ikke sandsynligt**